

# OTITE MEDIA ACUTA

Sicuramente vi sarà capitato che i vostri bambini dopo essersi tuffati in mare sporco o dopo aver fatto lunghi sottacqua abbiano iniziato a lamentare otalgia (dolore ad un orecchio). Nella maggior parte dei casi si tratta di **otite media acuta (OMA)** e la diagnosi di OMA deve essere effettuata in presenza del riscontro contemporaneo di: sintomatologia insorta acutamente nelle 48 ore precedenti; membrana timpanica con segni evidenti di flogosi; presenza di essudato. Anche la sola presenza di otorrea (liquido che fuoriesce dal condotto uditivo), deve essere considerata di per sé segno obiettivo certo di OMA quando è accompagnata anche da otalgia. Nella maggior parte dei casi si utilizza antinfiammatori senza l'utilizzo di antibiotici ma nel caso si aggravi è necessario utilizzarlo!

Vediamo in che caso...



# TRATTAMENTO

Il trattamento per i bambini superiore ai 24 mesi riguarda principalmente l'utilizzo di antinfiammatori con il dosaggio già suggerito nei precedenti consigli. Nel caso in cui diventi una situazione grave allora sarà necessario utilizzare l'antibiotico amoxicillina + acido clavulanico (80 – 90 mg/kg/die) in 2 somministrazioni quotidiane per 5 giorni!

Ma quando si definisce **grave**?

Ecco lo score da seguire:

**Tabella I. Score Italiano Gravità episodio OMA.**

L'episodio di OMA viene definito grave in caso di un punteggio allo score uguale o superiore a 4.

<b>Temperatura corporea ascellare</b>	
<38,0 °C	0
38,0-38,9 °C	1
≥39,0°C	2
<b>Compromissione condizioni generali</b>	
Assente	0
Presente	4
<b>Otalgia</b>	
Lieve/ moderata	0
Intensa e/o pianto inconsolabile	2
<b>Iperemia della MT</b>	
Lieve/ moderata	0
Intensa	2
<b>Estroflessione della MT</b>	
Lieve/ moderata	1
Marcata	4